

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА****1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

Дона, 1500 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь

**2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ**

Действующее вещество: глюкозамин

Каждый пакетик содержит 1500,0 мг глюкозамина сульфата и 384 мг натрия хлорида (в виде глюкозамина сульфата кристаллического).

Вспомогательные вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: натрий, аспартам, сорбитол (см. разделы 4.3., 4.4.).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

**3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА**

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Кристаллический порошок белого цвета.

**4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****4.1. Показания к применению**

Лекарственный препарат Дона показан к применению у взрослых и детей в возрасте старше 12 при:

- Первичном и вторичном остеоартрите;
- Остеохондрозе;
- Спондилоартрозе.

**4.2. Режим дозирования и способ применения**

Режим дозирования

Взрослые

1 пакетик 1 раз в сутки.

Симптоматический эффект наступает через 2-3 недели после начала приема препарата.

Минимальный курс терапии составляет 4-6 недель.

Продолжительность лечения определяет лечащий врач.

Дети

*Дети старше 12 лет*

Режим дозирования аналогичен режиму дозирования для взрослых.

Продолжительность лечения определяет лечащий врач.

*Дети с 0 до 12 лет*

Безопасность и эффективность препарата Дона у детей до 12 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

Способ применения

Внутрь.

Содержимое одного пакетика растворяют в 200 мл воды.

**4.3. Противопоказания**

- Гиперчувствительность к глюкозамину, аспартаму и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.;
- Фенилкетонурия (из-за содержания в препарате аспартама);

- Беременность и период грудного вскармливания из-за отсутствия научных клинических данных.
- Дети до 12 лет.

#### **4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении**

При непереносимости морепродуктов (креветки, моллюски) возрастает вероятность развития аллергических реакций.

При назначении лекарственного препарата Дона пациентам с нарушенной толерантностью глюкозы, с выраженной печеночной и почечной недостаточностью необходим тщательный медицинский контроль за пациентами

##### Вспомогательные вещества

Лекарственный препарат содержит аспартам, который является источником фенилаланина. Препарат противопоказан пациентам с фенилкетонурией (см. раздел 4.3).

Данный лекарственный препарат содержит 6,57 ммоль (или 151 мг) натрия на дозу. Необходимо учитывать пациентам, находящимся на диете с ограничением поступления натрия.

#### **4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия**

Увеличивает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает – полусинтетических пенициллинов, хлорамфеникола.

Препарат совместим с парацетамолом, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) и глюкокортикостероидами.

#### **4.6. Фертильность, беременность и лактация**

Препарат Дона противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания (см. раздел 4.3).

#### **4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами**

Не изучалось влияние препарата на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами.

#### **4.8. Нежелательные реакции**

##### Резюме нежелательных реакций

Переносимость препарата хорошая, в отдельных случаях возможны: гастралгия, метеоризм, диарея, запор, аллергические реакции – крапивница, зуд.

##### Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Адрес эл. почты: [pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

Веб сайт: <https://roszdravnadzor.gov.ru>

Республика Казахстан  
Z00T6E5, г. Астана, район Байконыр, ул. А.Иманова, 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)  
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан  
Единый call-center: +7 (717) 235 135  
Адрес эл. почты: [farm@dari.kz](mailto:farm@dari.kz)  
Веб сайт: [www.ndda.kz](http://www.ndda.kz)

Республика Армения  
Адрес: Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/5  
«Научный Центр Экспертизы Лекарств и Медицинских Технологий имени Академика Э.Габриеляна» АОЗТ (НЦЭЛМТ)  
Тел.: (+374 60) 830073, (+374 10) 230896, 231682  
Эл. почта: [vigilance@pharm.am](mailto:vigilance@pharm.am)  
Веб сайт: [www.pharm.am](http://www.pharm.am)

Республика Беларусь  
Адрес: 220045, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, 83, корпус 15  
Министерство Здравоохранения Республики Беларусь РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», Республиканская клиничко-фармакологическая лаборатория  
Тел.: +375-17-242-00-29  
Эл. почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by)  
Веб сайт: [www.rceth.by](http://www.rceth.by)

#### 4.9. Передозировка

Случаи передозировки неизвестны.  
Лечение: промывание желудка, симптоматическое лечение

### 5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

#### 5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: репарации тканей стимулятор  
Код АТХ: M01AX05

#### Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Препарат обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости; увеличивает проницаемость суставной капсулы, восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща. Способствует фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, облегчает нормальное отложение кальция в костной ткани, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая суставные боли.

#### 5.2. Фармакокинетические свойства

Всасывание в желудочно-кишечном тракте 90%, биодоступность 26%, период полувыведения – 70 часов.

### 6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

#### 6.1. Перечень вспомогательных веществ

Аспартам  
Сорбитол  
Карбовакс 4000 (макрогол 4000)

Лимонная кислота

## 6.2. Несовместимость

В связи с отсутствием исследований совместимости, данный лекарственный препарат не следует смешивать с другими лекарственными препаратами.

## 6.3. Срок годности (срок хранения)

3 года.

## 6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25 °С.

## 6.5. Характер и содержание первичной упаковки

По 3950 мг (1500 мг глюкозамина сульфата) в пакетики из трехслойного материала, изготовленного из бумаги, полиэтилена, запаянных вместе термическим способом с четырех сторон. Полиэтиленовая пленка непосредственно соприкасается с содержимым пакетика. По 20 или 30 пакетиков вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

## 6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата и другие манипуляции с препаратом

Нет особых требований к утилизации.

## 7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Германия

МЕДА Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Бенцштрассе 1, 61352, Бад Хомбург.

### 7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:

Российская Федерация

ООО «Майлан Фарма»

125315, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д.72, к.4

Тел.: +7 (495) 130-05-50

Факс: +7 (495) 130-05-51

Адрес электронной почты: [ru.info@viatris.com](mailto:ru.info@viatris.com)

Республика Казахстан

ИП «Имиров Н.Ж.»

Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Бухар Жырау, 75, кв. 7

Телефон: +7 708 972 27 97; +7 727 972 27 97

Адрес электронной почты: [infosafety.cis@viatris.com](mailto:infosafety.cis@viatris.com)

Республика Армения

0012, Армения, г. Ереван, ул. Комитас 7/4, кв. 12

Телефон: +374 44 838833

Адрес электронной почты: [infosafety.cis@viatris.com](mailto:infosafety.cis@viatris.com); [apotheka.office@gmail.com](mailto:apotheka.office@gmail.com)

Республика Беларусь

220025, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Курганная 2, кв.14

Телефон: +37 5293564228

Адрес электронной почты: [by.pv@cratia.ua](mailto:by.pv@cratia.ua); [infosafety.cis@viatris.com](mailto:infosafety.cis@viatris.com)

**8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ**  
ЛП-№(004081)-(РГ-RU)

**9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ,  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)**

Дата первой регистрации: 20.12.2023

**10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА**

Общая характеристика лекарственного препарата Дона доступна на информационном портале Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети «Интернет» <http://eec.eaeunion.org/>